

gion de Daouenlé. Afrique orientale anglaise, sud du lac Rodolphe et monts Matthews. Ouganda, Mont Lorphi.

Espèce cosmopolite.

8. OPETIOPALPUS sp.

Forme très voisine de l'*Op. nigriceps* Schenk. et que l'on sera peut-être amené dans la suite à distinguer spécifiquement. — Éthiopie méridionale, Kounhi. Un individu.

COLLECTIONS RECUEILLIES PAR M. LABBÉ AU COURS DE SA MISSION
EN SIBÉRIE, ÎLES SAKHALINE ET RÉGION DU LAC BAÏKAL, EN 1902,
ET DONNÉES AU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE DE PARIS.

Coléoptères du genre CARABUS

PAR M. G. DE LAPOUGE.

C. GRANULATUS YEZOENSIS Bates. — Sept exemplaires, quelques-uns tendant un peu vers la forme *Dauricus*. Un huitième, remarquable par rabougrissement régulier qui pourrait le faire prendre pour une variété nouvelle s'il était examiné isolément, ne peut cependant être séparé des autres. Angles du pronotum bien plus courts, plus arrondis, les élytres plats, très courts, plus courts que le corps, arrondis; sculpture très réduite; secondaires presque obsolètes, sauf sur le disque. Sakhaline.

C. GRANULATUS DAURICUS Motsch. — Un ♂ normal, un autre de l'aberration à cuisses rouges (*Solskyanus* Géh.), tous deux remarquables par l'allongement et la petitesse de la tête. Région du Baïkal, Jelan, juin.

C. ARVENSIS CONCILIATOR Fisch. — Trois exemplaires; forme, couleur et sculpture habituelles. L'un a cependant un corselet tendant un peu vers la forme de celui d'*arvensis*. Jelan, juin-juillet.

C. ARVENSIS DAHURICUS (?) Motsch. — Forme générale, et particulièrement du corselet, de l'*arvensis* d'Épinal. Taille encore plus grande (long. 24 millim., larg. 9 millim.). Tête et corselet très rugueux. Élytres à intervalles subégaux, striés fortement en travers, les secondaires non surhaussés, les primaires moniliformes, à grains moins longs sur le disque. Coloration chaude. Un ♂ dessus brun chaud, une ♀ dessus vert émeraude, tous deux à marges d'or rouge, très larges, au corselet et aux élytres. La ♀ a les épisternes et les côtés de l'abdomen très ponctués, et une soie supplémentaire à l'un des palpes; le ♂ normal. Jelan, juin. — Très différent du précédent, malgré l'identité d'époque et de localité; se rattache par le faciès et le coloris au groupe *Faldermanni* et non au groupe *conciliator*; répond exactement à la description du *Dahuricus* Motsch., nec Gebler.

C. *ARVENSIS* var. — Encore du groupe *Faldermanni*, série de six exemplaires, tous dissemblables, mais avec un faciès local commun difficile à définir. Plus long que *Conciliator* et surtout que *Faldermanni*. Corselet plus plan, plus rétréci en arrière, rappelant quelquefois plutôt nos *Arvensis* d'Europe, mais très rugueux et l'impression peu distincte; angles postérieurs plus courts. Élytres assez élargis au second tiers de leur longueur, épaules noires marquées. Secondaires non surhaussés, subégales aux tertiaires, striation transversale marquée. Primaires parfois peu saillants. Parfois épisternes et côtés de l'abdomen très ponctués (caractère très variable chez quantité de Carabes de la Sibérie orientale). Chez un exemplaire, trois soies à un palpe, anomalie déjà signalée chez la forme précédente, et d'une extrême rareté chez *Arvensis* de toutes autres races. Coloration chaude; métallique, très variable, rappelant celle d'*excellens*. Un exemplaire or sombré, à miroirs feu entre les chaînons des primaires, comme *excellens rubicundus* Lapouge; autres plus rembrunis, le dos des élytres brun chaud un lilas pourpré; un vert à reflets pourprés; tous avec de très larges marges d'or vert au corselet et aux élytres. Sakhaline. — Cette race imite un peu *Mac Leayi* par la couleur, la sculpture, la forme du corselet, mais non par la tête. Je l'appellerai provisoirement *Sachalinensis*, mais il serait difficile de donner une diagnose commune à ces insectes variables.

C. *CANALICULATUS* Ad. — Un ♂ tout noir, à corselet un peu rétréci en avant. Irkoutsk, mai.

C. *AERUGINOSUS* var. — Un ♂ tout noir, large; secondaires et tertiaires entiers. Le corselet est étroitement ourlé. Cette race de la région du Baïkal, très distincte par le corselet simplement ourlé, de celles de la Sibérie occidentale, est en continuité avec celle, plus maigre et souvent rufine, de la Transbaïkalie. Toutes deux n'ont point de nom, et il y aura lieu de faire une révision des formes de cette espèce, établies pour la plupart sur des détails de sculpture communs chez les diverses races. Le *gryphus* de Motschulsky a été établi d'après un exemplaire très étroit, à sculpture moins entière et moins lisse, de la race du Baïkal. On trouve dans les collections, sous le nom d'*aereus*, la forme de Transbaïkalie, mais le vrai *Aereus* ne se trouve que très à l'Ouest du Baïkal et a le corselet pourvu de gouttières plus ou moins développées. Environs d'Irkoutsk, dans le Toïka, 15 juin.

C. *REGALIS* DUBIUS Motsch. — Série de 17 exemplaires. Plus petit, plus étroit, plus convexe que le *regalis*, même que les exemplaires de la Selenga rapportés par M. Chaffanjon, ressemblant assez à *Sahlbergi*, mais facile à distinguer par ses antennes simples et son apex large. Intervalles serrés, peu segmentés; stries guère plus larges que les intervalles, sans aspérités. Primaires simplement segmentés. Pronotum moins large, à gouttière plus profonde, angles tout aussi saillants. Tibias ♂ très faiblement, ♀ nulle-

ment arqués. Dessus brun bronzé, marges du corselet et des élytres colorées, bronzées, dorées, d'un vert doré ou d'un violet métallique. Environs d'Irkoutsk, Jelan, juin. — Race très différente de celle de la Selenga, et qui me paraît être le *dubius*, d'autant que, d'après Motschulsky, le *regalis* n'existe pas à Irkoutsk, mais seulement son *dubius*. Cependant la description qu'il donne, notamment quant aux angles postérieurs nuls, n'est pas exactement applicable aux exemplaires de M. Labbé. Des exemplaires ont même, par les bords rabattus, l'aspect de certaines races maigres d'*excellens*. Ce sont peut-être de semblables exemplaires qui ont fait citer l'*excellens* comme étant d'Irkoutsk. J'ai appelé cette forme *fraudator*.

C. HENNINGI SAHLBERGI Dej. — Série de neuf exemplaires. Plus sombres, plus étroits, un peu moins grands que ceux de la Selenga; un à marges d'un bleu verdâtre. Pattes et antennes toujours noires. Jelan, juin.

C. HENNINGI CONTINUUS Lapouge. — Un ♂ ne différant des précédents que par les intervalles secondaires et tertiaires plus lisses, continus sur le disque, très peu coupés hors du disque. Jelan. — Le corselet est à peu près celui que Motschulsky attribue à son *dubius*, et j'ai longtemps regardé cette forme comme se rapportant au *dubius*, mais la remarque de l'auteur rapportée plus haut m'a fait changer d'avis.

C. TUBERCULOSUS Dej. — Une ♀ de petite taille, sculpture faible. Région du Baïkal, sans localité, juin ou juillet.

C. KRUBERI v. BUNGEI Gebl. — Un ♂ et une ♀. Gros, ventrus, la ♀ mate; primaires à grosses fossettes serrées, interrompant les quaternaires, chaînons relevés ♀, plats ♂; secondaires et tertiaires assez saillants, râpeux; stries larges, laissant voir des quaternaires granuleux, rudimentaires. Apex très gros, conformé comme celui de *Bonplandi*, mais plus redressé à la pointe; je n'ai pas trouvé, après comparaison avec les apex, collés sur cartes, de plus de cinquante espèces, un terme de comparaison plus approprié. Environs d'Irkoutsk, Markova, juin.
